

Eksamen 2P våren 2024

24.05.2024

Del 1

Oppgave 1

Startar med å sortera observasjonane i stigande rekkjefølgje:

0 1 2 2 3 4 4 5 7 12

Gjennomsnitt:

$$\bar{x} = \frac{0 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 7 + 12}{10} = \frac{40}{10} = 4$$

Gjennomsnittet er 4 timar.

Median: Medianen er den midterste observasjonen når observasjonane er sorterte i stigande rekkefølge. Her er det 10 observasjonar, så medianen er gjennomsnittet av observasjon nummer 5 og 6.

$$\text{median} = \frac{3 + 4}{2} = 3.5$$

Medianen er 3.5 timar.

Oppgave 2

At KPI er 129.6 i 2023 betyr at prisnivået i 2023 er 29.6% høgare enn i 2015. Bruker vekstfaktor for å finna ut kva ei vare som kosta 500 kr i 2015 vil kosta i 2023:

$$500 \text{ kr} \cdot 1.296 = 648 \text{ kr}$$

Vara vil kosta 648 kr i 2023.

Tips til hovudrekning: Ta utgangspunkt i ei vare som kosta 1000 kr i 2015 og finn ut kva den ville kosta i 2023.

$$1000 \text{ kr} \cdot 1.296 = 1296 \text{ kr}$$

Så kan du dela dette på to for å finna ut korleis det ville gått med ei vare til halve prisen (500 kr).

Oppg ve 3

Dersom Astrid veit at ei rett gate er 300 meter i verkelegheita og 2 cm p  kartet kan ho bruka dette for   finna m lestokken til kartet. Ho m  starta med   finna ut kor mange cm 300 meter er:

$$300m = 30000 \text{ cm}$$

D  veit ho at 2 cm p  kartet svarar til 30000 cm i verkelegheita. Dermed veit me at 1 cm p  kartet svarar til $\frac{30000}{2} = 15000$ cm i verkelegheita.

M lestokken til kartet er 1:15000.

Oppg ve 4

Set opp eit likninssystem for   finna prisane.

La x vera prisen p  ein ispinne og y vera prisen p  ein brusboks.

Den f rste likninga finn me ved   sj  p  totalprisen og kor mange dei kj pte av kvar.

$$30 \cdot x + 30 \cdot y = 900$$

Den andre likninga finn me ved   sj  p  at prisen p  ein brusboks er 6 kr meir enn prisen p  ein ispinne.

$$y = x + 6$$

L yser likningssystemet:

Set den andre liknina inn i den f rste. D  f r me at

$$30x + 30y = 900$$

$$30x + 30(x + 6) = 900$$

$$30x + 30x + 30 \cdot 6 = 900$$

$$60x = 900 - 180 = 720$$

$$x = \frac{720}{60} = 12$$

Sett inn x i den andre likninga for   finna y :

$$y = x + 6 = 12 + 6 = 18$$

Prisne for ein ispinne er 12 kr og prisen for ein brusboks er 18 kr.

Oppgave 5

Nora kan velja mellom 2 for 32 kr eller 4 for 48 kroner. Prisen per bagett er henholdsvis 16 kr og 12 kr.

$$\frac{\text{endring}}{\text{utgangspunkt}} = \frac{16 - 12}{16} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4} = 0.25$$

Prisen blir 25 % lågare per bagett dersom ho kjøper fire bagettar i staden for to.

Alternativ løysing med vekstfaktor

$$\text{startverdi} \cdot \text{vekstfaktor} = \text{sluttverdi}$$

$$\text{vekstfaktor} = \frac{\text{sluttverdi}}{\text{startverdi}}$$

$$\text{vekstfaktor} = \frac{12}{16} = 0.75$$


Vekstfaktor på 0.75 svarar til ein reduksjon på 25 %.

Del 2

Oppgave 1

- a) Lar x vera talet på månader etter november 2023. Skriv inn i reknearket i Geogebra med x i kolonne A og tal følgjarar i kolonne B.

Markerer cellene i tabellen og vel "Regresjonsanalyse". Sidan det er snakk om prosentvis vekst vel me "Eksponentiell".



Ser at vekstfaktoren i funksjonsuttrykket er 1.35 som vil seie at talet på følgjarar aukar med 35% kvar måned.

- b) Ser på kva som skjer med 5 prosentpoeng auke i tal følgjarar per måned etter april 2024.

A	B	C	
1	Vekst før april	35 %	
2	Auke pr. mnd	5 %	
3			
4	Månad	Følgjarar	Vekstfaktor
5	April	24 008	1,35
6	Mai	33 611	1,40
7	Juni	48 736	1,45
8	Juli	73 104	1,50
9	August	113 312	1,55

A	B	C	
1	Vekst før april	0,35	
2	Auke pr. mnd	0,05	
3			
4	Månad	Følgjarar	Vekstfaktor
5	April	24008	=1+B1
6	Mai	=B5*C6	=C5+B\$2
7	Juni	=B6*C7	=C6+B\$2
8	Juli	=B7*C8	=C7+B\$2
9	August	=B8*C9	=C8+B\$2

Ser at talet på følgjarar vil vera 33 611 i mai og 48 736 i juni dersom Tuva klarar å nå målet sitt.

- c) Finn ut kor mange følgarar Tuva ville hatt i august 2024 dersom veksten hadde vore 35% vidare. Ser vidare på kor mange prosent fleire følgarar det nye målet ville gitt framfor den opphavlege veksten.

$$\begin{array}{l} 1 \quad 24008 \cdot 1.35^4 \\ \circ \quad \approx \mathbf{79742.72} \\ \hline 2 \quad \frac{113312}{79743} \\ \circ \quad \approx \mathbf{1.42} \end{array}$$

Tuva ville hatt ca. 42% fleire følgarar i august 2024 dersom ho hadde nådd det nye målet sitt.

Oppg ve 2

Turane til Solveig:

8	4	7	5	10	3	12	6	8	9
6	5	8	9	11	5	3	7	9	8

Miriam:

- Gjennomsnitt: 4.7 timar per tur
- Median: 4 timar
- Standardavvik: 4.2 timar

a) Reknar ut gjennomsnitt, median og standardavvik for Solveig sine turar i GeoGebra.

The screenshot shows the GeoGebra interface with a list of data points and calculated statistics. The data points are: 8, 4, 7, 5, 10, 3, 12, 6, 8, 9, 6, 5, 8, 9, 11, 5, 3, 7, 9, 8. The calculated statistics are: Gjennomsnitt = 7.2, Median = 7.5, and a = 2.5.

	A	B
1	8	6
2	4	5
3	7	8
4	5	9
5	10	11
6	3	5
7	12	3
8	6	7
9	8	9
10	9	8
11		
12		

- Liste
 data = A1 : B10
 = {8, 4, 7, 5, 10, 3, 12, 6, 8, 9, 6, 5, 8, 9, 11, 5, 3, 7, 9, 8}
 - Tall
 Gjennomsnitt = gsnitt(data)
 = 7.2
 Median = Median(data)
 = 7.5
 a = stavvp(data)
 = 2.5

Solveig sine turar:

- Gjennomsnitt: 7.2 timar per tur
- Median: 7.5 timar
- Standardavvik: 2.5 timar

Ut fr  desse opplysingane ser me at Solveig i snitt g r lengre turar. Standardavviket fortel at det er st rre variasjon i turane til Miriam enn til Solveig.

Miriam har eit gjennomsnitt som er h gare enn medianen, som tyder p  at det er nokre lange turar som drar opp gjennomsnittet. Solveig har eit gjennomsnitt som er l gare enn medianen, som tyder p  at det er nokre korte turar som drar ned gjennomsnittet.

b) Ser på dei to påstandane kvar for seg.

1) Miriam og Solveg gjekk 3 skiturar på 5 timar saman

Av tabellen med kumulative frekvensar ser me at 11 av turane var 3 timar eller kortare. Me ser også at 14 av turane var 5 timar eller kortare. Dette vil seie at det er 3 turar som var 5 timar lange.

Påstanden stemmer

2) Miriam var ikkje med alle gongane Solveig gjekk ein skitur på 8 timar

Av tabellen ser me at dei har gått $17 - 14 = 3$ turar på 8 timar saman. Samtidig veit me frå oppgåve a) at Solveig har gått 4 turar på 8 timar. Dette vil seie at Miriam ikkje har vore med alle gongane Solveig har gått ein skitur på 8 timar.

Påstanden stemmer

Oppgave 3

I histogrammet er frekvensen lik arealet av søylene (klassebreidd \cdot høgd). Dermed kan me skriva inn opplysingane i histogrammet til ein tabell:

Klasse	Frekvens
$[0, 40)$	$40 \cdot 2 = 80$
$[40, 60)$	$20 \cdot 6 = 120$
$[60, 100)$	$40 \cdot 5 = 200$
$[100, 150)$	$50 \cdot 2 = 100$

Til saman på skulen er det då $80 + 120 + 200 + 100 = 500$ elevar.

Går gjennom dei ulike påstandane:

Påstand 1: 80 elevar brukte mindre enn 40 minutt på lekser denne ettermiddagen.


Ser av frekvenstabellen at påstanden stemmer.

Påstand 2: Den relative frekvensen for 100-150 minutt brukter på lekser er $\frac{1}{5}$.

Ser av frekvenstabellen at det er 100 elevar som brukte 100-150 minutt på lekser. Dette er $\frac{1}{5}$ av 500 elevar, så påstanden stemmer.

Påstand 3: Elevane som brukte mindre enn 60 minutt på leksene, brukte i gjennomsnitt 38 minutt.

Legg inn klassegrenser og frekvenser i Geogebra og finn gjennomsnittet.



The screenshot shows the Geogebra command list with the following entries:

- grenser = {0, 40, 60}
- frekvensar = {80, 120}
- Gjennomsnitt = gsnitt(grenser, frekvensar)
= 38
- Median = Median(grenser, frekvensar)
= 43.33

Gjennomsnittet er 38 minutt så påstanden stemmer.

Påstand 4: For elevane som brukte mindre enn 60 minutt på leksene, er medianen for talet på minutt høgare enn gjennomsnittet for talet på minutt.

Ser av utrekningane over at medianen er ca. 43 minutt så påstanden stemmer.

Oppgave 4

a) Sara jobbar med å løyse likningssettet

$$\begin{aligned}4x &= -12 + y \\ 2x + 24 - y &= 2x^2\end{aligned}$$

Ser at likningane kan skrivast om til "y = ...". Då får me:

$$\begin{aligned}y &= 4x + 12 \\ y &= -2x^2 + 2x + 24\end{aligned}$$

Ser at dette tilsvarar henholdsvis $f(x)$ og $g(x)$ i programkoden i oppgåveteksten.

I for-løkka (rad 7-10 i koden) går Sara gjennom heiltalls x -verdiar frå og med -5 til og med 4 . For kvar x -verdi reknar ho ut verdiane for $f(x)$ og $g(x)$. Dersom desse er like, skriv ho ut x - og y -verdien. Frå det omskrivne likningssettet ser me at $f(x)$ blir det samme som y her.)

b) Ole jobbar med likningssettet

$$\begin{aligned}2x &= y - 8 \\ x^2 + x - 48 &= y\end{aligned}$$

Skriv om på same måte som i a):

$$\begin{aligned}y &= 2x + 8 \\ y &= x^2 + x - 48\end{aligned}$$

Det første Ole må gjera er å endra $f(x)$ og $g(x)$ i programkoden til å tilsvara høgresidene i dei omskrivne likningane.

Sjekkar likningssettet i CAS:

```
1 y = 2x + 8;
2 y = x^2 + x - 48;
3 Løs({$1, $2})
→ {{x = 8, y = 24}, {x = -7, y = -6}}
```

Ser her at likningssettet ikkje har nokon løysingar i det intervallet som Sara brukte i sin kode. Ole må derfor utvida området han undersøker om han skal finna løysingar. T.d. kan han endra til for i in range(-10, 10):

Oppg ve 5

Ut fr  oppg veteksten les me at

- forma er ei rettavkorta kjegle \rightarrow grunnflata er ein sirkel
- grunnflata m  passa p  eit kvadrat p  $20 \text{ m}^2 \rightarrow$ me kan finna st rste radius som passar.
- toppen skal vera 2.5 m over bakken og ha eit areal p  $10 \text{ m}^2 \rightarrow$ finn ein passende radius

Grunnflata: Bruker CAS for   finna radiusen til grunnflata. Viss kvadratet har sidelengd s vil radiusen til sirkelen vera $r = \frac{s}{2}$. Ser at radiusen til grunnflata m  vera 2.24 meter.

$$\begin{array}{l} 1 \\ \circ \end{array} \text{ L s}(s^2 = 20) \\ \approx \{s = -4.47, s = 4.47\}$$

$$\begin{array}{l} 2 \\ \circ \end{array} r := \frac{4.47}{2} \\ \approx r := 2.24$$

Plattformen: Bruker CAS for   finna radiusen som tilsvarar eit areal p  10 m^2 . Kallar plattformradiusen for r_p og bruker at arealet av ein sirkel er $A = \pi r^2$. Plattformradiusen m  vera 1.78 meter.

$$\begin{array}{l} 3 \\ \circ \end{array} \text{ L s}(\pi r_p^2 = 10) \\ \approx \{r_p = -1.78, r_p = 1.78\}$$


H gdene: No m  me finna ut kor h g kjegla er f r ho vert rettavkorta og kor h g kjegla me fjernar fr  toppen er. Viss den st rste kjegla har h gd x vil toppen ha h gd $x - 2.5$ (sidan me skal la det st  att 2.5 meter). Den eine kjegla er toppen av den andre kjegla som gjer at me kan bruka formlikskap for   finna h gdene. Formlikskapen gjer at forholdet mellom h gde og radius i dei to kjeglene m  vera like. Bruker CAS:

$$\begin{array}{l} 1 \\ \circ \end{array} \text{ L s}\left(\frac{x}{2.24} = \frac{x - 2.5}{1.78}\right) \\ \approx \{x = 12.17\}$$

$$\begin{array}{l} 2 \\ \circ \end{array} 12.17 - 2.5 \\ \approx 9.67$$

Den st rste kjegla har h gd 12.17 meter og kjegla i toppen har h gd 9.67 meter.

- a) Bruker GeoGebra til å teikne skissa (teiknar frå sida for å gjera det enkelt). Bruker måla på radius og høgde og trekk linjer mellom hjørnepunkta på klatreveggen.



- b) For å finne volumet av den rettavkorta kjegla finn me volumet av den store kjegla og trekk frå volumet av den minste kjegla. Formelen for volum av ei kjegle er gitt ved

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

Bruker CAS:

1	$V_{\text{stor}} := \frac{1}{3} \pi \cdot 2.24^2 \cdot 12.17$
	$\approx V_{\text{stor}} := \mathbf{63.95}$
2	$V_{\text{liten}} := \frac{1}{3} \pi \cdot 1.78^2 \cdot 9.67$
	$\approx V_{\text{liten}} := \mathbf{32.08}$
3	$\text{Betong} := V_{\text{stor}} - V_{\text{liten}}$
	$\approx \mathbf{Betong} := \mathbf{31.86}$

Det vil gå med ca. 32 m^3 betong for å laga klatreveggen.

Oppgave 6

- a) Ut frå biletet skal det betalast 10 495 kr pr. mnd. Dermed er lånet er eit annuitetslån sidan det er eit **fast terminbeløp** i heile perioden. (I eit serielån er **avdraga like**, medan terminbeløpet minkar gradvis).

Grunnen til at Johannes ikkje kan leggja inn meir enn 1 700 000 kr som ønskt lånebeløp handlar om kravet på 15 % eigenkapital. 15% av 2 000 000 kr er 300 000 kr, og dermed kan han ikkje låna meir enn 1 700 000 kr.

- b) Når ein reknar ut årsrente som gjort i oppgåveteksten

$$(1 + 0.015)^{12} = 1.1956$$

tek ein omsyn til renters rente. Om ein set inn x kr vil det ha forrenta seg til $x \cdot 1.015$ kr etter ein månad. Etter to månader vil det ha forrenta seg til $x \cdot 1.015 \cdot 1.015 = x \cdot 1.015^2$ kr. Etter eitt år vil det ha forrenta seg til $x \cdot 1.015^{12}$ kr.

For å rekne ut kor mykje ei rente på 5.49% årleg rente svarar til per månad kan ein løyse likninga

$$x^{12} = 1.0549$$

Då finn ein den vekstfaktoren som opphøgd i 12 gir 1.0549. Bruker CAS:

$$\begin{array}{l} 1 \\ \circ \end{array} \text{ Løs}(x^{12} = 1.0549) \\ \approx \{x = -1.0045, x = 1.0045\}$$

Altså vil 5.49% årleg rente svara til 0.45% per månad.

- c) Finn først ut kor mykje Johannes må betala i renter den første månaden.

$$\begin{array}{l} 2 \\ \circ \end{array} 0.0045 \cdot 1700000 \\ \approx \mathbf{7650}$$

Ser vidare kor stor del dette er av terminbeløpet

$$\begin{array}{l} 3 \\ \circ \end{array} \frac{7650}{10495} \\ \approx \mathbf{0.729}$$

Dvs. at omlag 73% av terminbeløpet går til renter, og 27% går til avdrag den første månaden.

d) Bruker Excel og reknar ut nettoløn og totale utgifter før evt. kjøp av bustad.

	A	B
1	Inndata	
2	Fast månedsløn	kr 52 000,00
3	Pensjonstrekk	2,0 %
4	Fagforeningstrekk	1,2 %
5	Skattetrekk	32,0 %
6		
7	Inntekter	
8	Fastløn	kr 52 000,00
9	Pensjonstrekk	kr 1 040,00
10	Fagforeningstrekk	kr 624,00
11	Trekkgrunnlag	kr 50 336,00
12	Skattetrekk	kr 16 107,52
13	Nettoløn	kr 34 228,48
14		
15	Utgifter	
16	Individspesifikke utgifter (SIFO)	kr 8 683,00
17	Husholdsspesifikke utgifter (SIFO)	kr 3 610,00
18	Studielån	kr 1 600,00
19	Forsikringar	kr 2 000,00
20	Sum utgifter	kr 15 893,00
21		
22	Resultat (før lån)	kr 18 335,48

	A	B
1	Inndata	
2	Fast månedsløn	52000
3	Pensjonstrekk	0,02
4	Fagforeningstrekk	0,012
5	Skattetrekk	0,32
6		
7	Inntekter	
8	Fastløn	=B2
9	Pensjonstrekk	=B8*B3
10	Fagforeningstrekk	=B8*B4
11	Trekkgrunnlag	=B8-B9-B10
12	Skattetrekk	=B11*B5
13	Nettoløn	=B11-B12
14		
15	Utgifter	
16	Individspesifikke utgifter (SIFO)	8683
17	Husholdsspesifikke utgifter (SIFO)	=3610
18	Studielån	1600
19	Forsikringar	2000
20	Sum utgifter	=SUMMER(B16:B19)
21		
22	Resultat (før lån)	=B13-B20

Ut frå berekningane over har Johannes 18 335,48 kr til rådighet etter at han har betalt alle utgiftene sine. Dermed har han råd til å betala 10 495 kr i månaden for bustadlånet.

Gitt at han har klart å spare opp eigenkapital og føl budsjettet over vil han både kunna betena lånet og ha litt att til oppsparing av evt. bufferkonto til uforutsette utgifter og etterkvart generell sparing.

Johannes har råd til å kjøpe leiligheita.